

E-Monographie

Solanum dulcamara – Bittersüß, Bittersüßer Nachtschatten

Dulcamarae stipites (Bittersüßstengel)

Veröffentlichungsdatum 01.06.90

Bundesanzeiger 101

Bezeichnung des Arzneimittels

Dulcamarae stipites; Bittersüßstengel

Bestandteile des Arzneimittels

Bittersüßstengel, bestehend aus den getrockneten, 2 - 3jährigen, im Frühjahr vor dem Austreiben der Blätter oder Spätherbst nach dem Abfallen der Blätter gesammelten Stengeln von Solanum dulcamara LINNÉ, sowie deren Zubereitungen in wirksamer Dosierung.

Die Droge enthält Gerbstoffe, Steroidalkaloide und Steroidsaponine.

Anwendungsgebiete

Zur unterstützenden Therapie bei chronischem Ekzem.

Gegenanzeigen

Nicht bekannt.

Nebenwirkungen

Nicht bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Nicht bekannt.

Dosierung

Soweit nicht anders vorordnet:

Einnahme:

Tagesdosis 1-3 g Droge, Zubereitungen entsprechend.

Äußere Anwendung:

Aufgüsse oder Abkochungen entsprechend 1-2 g Droge auf ca. 250 ml Wasser.

Art der Anwendung

Zerkleinerte Droge für Teeaufgüsse sowie andere galenische Zubereitungen zum Einnehmen sowie für Umschläge und Waschungen.

Wirkungen

- adstringierend

- antimikrobiell

- schleimhautreizend

Steroidalkaloide: anticholinerg

Solasodin: antiphlogistisch.

Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums (Kommission E) zum Einsatz pflanzlicher Arzneimittel (Monographie BGA/BfArM), erschienen im Bundesanzeiger